

ដេរីវេ

I- បុព្វយោគ

ដេរីវេសំខាន់ណាស់ ព្រោះយើងត្រូវការជានិច្ច ក្នុងការរៀនអនុគមន៍ ។
 ចំពោះដេរីវេ យើងគ្រាន់តែចេះចាំរូបមន្តទៅ បន្ទាប់មកយើងងាយប្រើបំផុត ។
 នៅក្នុងមេរៀននេះ អនុគមន៍ ដែលនឹងយកមកសិក្សា (បើមិនបញ្ជាក់) គឺអនុគមន៍ ពី R ទៅ R
 (ដោយ R ជាចំនួនពិត) ។

II- តើដេរីវេជាអ្វី?

កាលណាគេមានអនុគមន៍ f គេអាចគិតរកអនុគមន៍មួយទៀត ដែលគេសរសេរជា f'
 (មើលថា f ត្រឹម) ហើយហៅថា « ដេរីវេ » ។ យើងនឹងឃើញនៅពេលក្រោយ ប្រយោជន៍
 នៃ ដេរីវេ ។

បំណងនៅពេលនេះ គឺធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីគណនា f' បើគេដឹង f ។
 មិនពិបាកទេ គឺគ្រាន់ប្រើរូបមន្ត ដូចតទៅនេះ ៖

III- រូបមន្ត ដេរីវេ (ដោយទទួលសិន)

តារាងខាងក្រោមនេះ មាន ២ជួរ ជួរខាងឆ្វេងមានអនុគមន៍ f និងជួរខាងស្តាំ មាន
 អនុគមន៍ f' ។ ចូរទន្ទេញ f និង f' ឲ្យចាំមាត់។

លេខរៀង	f	f'
1	ចំនួន ថេរ (ដូចជា a, A ឬ $12,30$ ជាដើម) គឺចំនួនដែលគ្មាន អថេរ x ជាប់ជាមួយ	0

2	$x^1 = x$	1
3	x^2	$2x$
4	x^3	$3x^2$
5	x^n	nx^{n-1}
6	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
7	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
8	$\sin x$	$\cos x$
9	$\cos x$	$-\sin x$

ឧទាហរណ៍

- $f(x) = 6 \Rightarrow f'(x) = 0$ (តាមរូបមន្ត ទី១ ខាងលើ)

- $f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x$ (តាមរូបមន្ត ទី៣ ខាងលើ)

រូបមន្តដែលពិបាកប្រើបន្តិច គឺ $f(x) = x^n$ (រូបមន្តទី៥ ខាងលើ)។ តែរូបមន្តនេះ

ប្រើបានជានិច្ច រហូតដល់ចំនួនគត់វិជ្ជាទីប (Z) និងចំនួនសនិទាន (Q) ដូចជា $n = 2, 3, -12, \frac{1}{2}$ ជាដើម ។

- ចំពោះ $n = -1$, $f(x) = x^n$ ទៅជា $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ ហើយ $f'(x) = nx^{n-1}$ ទៅជា

$f'(x) = -1x^{-1-1} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$ ដូច្នេះ យើងឃើញឡើងវិញរូបមន្តទី ៦ ។

- ចំពោះ $n = \frac{1}{2}$, $f(x) = x^n$ ទៅជា $f(x) = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ ហើយ $f'(x) = nx^{n-1}$ ទៅជា

$f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ដូច្នេះ យើងឃើញឡើងវិញរូបមន្តទី ៧ ។

ក- ដេរីវេ អនុគមន៍ ពហុធាតុ

a/ $f(x) = x^5 - 2x^2 + 12 \Rightarrow f'(x) = 5x^4 - 2x + 0$
 $= 5x^4 - 2x$

b/ $f(x) = 9x^5 \Rightarrow f'(x) = 9 \times 5 \times x^4$
 $= 45x^4$

ខ- ដេរីវេ អនុគមន៍ គុណ ឬ ចែក

គេច្រើនហៅអនុគមន៍ទាំងពីរ ថា u និង v

$$(u \times v)' = u'v + uv' \quad (\text{អនុគមន៍គុណ})$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (\text{អនុគមន៍ចែក})$$

ឧទាហរណ៍

a/ អនុគមន៍គុណ :

$$f(x) = (2x+1) \times (x^2 - 9)$$

$$\text{នៅពេលនេះ } u = 2x+1 \Rightarrow u' = 2$$

$$v = x^2 - 9 \Rightarrow v' = 2x$$

ដោយប្រើរូបមន្ត $f'(x) = u'v + uv'$ យើងបាន

$$f'(x) = 2(x^2 - 9) + (2x+1)2x$$

$$f'(x) = 6x^2 + 2x - 18$$

ត្រូវប្រយ័ត្ន: មិនត្រូវថា $(uv)' = u' \times v'$ ទេ

b/ អនុគមន៍ចែក :

$$f(x) = \frac{(5x + 1)}{(x^6 + 7x - 2)}$$

$$u = 5x + 1 \Rightarrow u' = 5$$

$$v = x^6 + 7x - 2 \Rightarrow v' = 6x^5 + 7$$

ដោយប្រើរូបមន្ត $f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ យើងបាន

$$f'(x) = \frac{5(x^6 + 7x - 2) - (5x + 1)(6x^5 + 7)}{(x^6 + 7x - 2)^2}$$

ត្រូវចាំថាគេមិនបំបែកភាគបែង $(x^6 + 7x - 2)^2$ ទេ ព្រោះឥតប្រយោជន៍ តែគេត្រូវបំបែក

$$\text{ភាគយក } 5(x^6 + 7x - 2) - (5x + 1)(6x^5 + 7) \quad 1$$

$$\text{គេបាន } f'(x) = \frac{-25x^2 - 6x^5 - 17}{(x^6 + 7x - 2)^2}$$


គ- ដើរវិវេ អនុគមន៍បណ្តាក់

អ្វីទៅអនុគមន៍បណ្តាក់? គឺអនុគមន៍ ពីរ រួមគ្នា

ឧទាហរណ៍-1

ដោយមិនយក $g(x) = \sqrt{x}$


គេយក $f(x) = \sqrt{8x^2 - 5x + 4}$ ហើយ អនុគមន៍ f នេះ គេហៅថាអនុគមន៍បណ្តាក់ ព្រោះ ក្នុង អនុគមន៍ f នេះ មានអនុគមន៍ ពីរ គឺ អនុគមន៍ពហុធា $u(x) = 8x^2 - 5x + 4$ មួយ និង អនុគមន៍ រ៉ាស៊ីនការេ ($\sqrt{}$) មួយ ។



ឧទាហរណ៍-2

ដោយមិនយក $g(x) = \frac{1}{x}$

គេយក $f(x) = \frac{1}{8x^6 + 4x^7 - 6x}$ វិញ




ឧទាហរណ៍-3

ដោយមិនយក $g(x) = x^2$

(¹) អាំងវែស (inverse) ជាភាសាបារាំង គេថា ចំនួន a' ជា អាំងវែស នៃចំនួន a ($a \neq 0$) កាលណា

$a' = \frac{1}{a}$ ឬ $a \times a' = a' \times a = 1$ ។ (ខ្ញុំសុំប្រើពាក្យខ្លះ ជាបណ្តោះអាសន្នទេ ដើម្បីកុំឲ្យស្ទុះកិច្ចការដែលខ្ញុំយល់ថា ជាប្រយោជន៍ ដល់យុវជន យុវនារីខ្មែរខ្លះ ដែលជានិស្សិត សូមមេត្តា អភ័យទោស)

គេយក $f(x) = (5x^9 - 2x + 6)^2$ វិញ



សង្កេត - (R-III-01)

ចំពោះ $f(x)$, x ជាអថេរ របស់អនុគមន៍ f

ចំពោះ $f(u(x))$, x ជាអថេរ របស់អនុគមន៍ u ហើយ $u(x)$ ជាអថេររបស់អនុគមន៍ f

ដូច្នេះដើម្បី ឲ្យរូបមន្តដេរីវេ អាចប្រើបានចំពោះអនុគមន៍បណ្តាក់ និងអនុគមន៍មិនបណ្តាក់ នោះនៅក្នុងតារាងដូចតទៅនេះ គេសរសេរ u ជំនួស x វិញ ដោយសន្មត់ថា :

$u = x$ ចំពោះអនុគមន៍ មិនបណ្តាក់ ហើយ

$u = u(x)$ ចំពោះអនុគមន៍ បណ្តាក់

លេខរៀង	f	f'
1	u^2	$2u \times u'$
2	u^3	$3u^2 \times u'$
3	u^n	$nu^{n-1} \times u'$
4	$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
5	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
6	$\sin u$	$\cos u \times u'$
7	$\cos u$	$-\sin u \times u'$

ឧទាហរណ៍-4

$$y = \sin(\omega x + \pi) \Rightarrow y' = \cos(\omega x + \pi) \times \omega \text{ (ដោយរូបមន្ត ទី 6)}$$

$$= \omega \cos(\omega x + \pi)$$

IV-ការអនុវត្ត

១- គេប្រើដេរីវេ ដើម្បីសិក្សាអំពី អថេរភាពនៃអនុគមន៍

- បើ $f' \geq 0$, f ជាអនុគមន៍ កើន
- បើ $f' \leq 0$, f ជាអនុគមន៍ ចុះ

ឧទាហរណ៍

$$f(x) = x^2 - 6x + 4$$

គេរកតារាងអថេរភាពនៃ f

មុនដំបូងគេរក f' :

$$f'(x) = 2x - 6$$

បំណងគឺរក សញ្ញា នៃ f'

ដើម្បីរកសញ្ញា f' យើងរក x ដែល $f'(x) = 0$


$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$$

តារាង សញ្ញា f' :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	-		+

ឥឡូវប្រើទ្រឹស្តីបទខាងលើ: (បើ $f' \leq 0$, f ចុះ) ហើយ (f កើន បើ $f' \geq 0$)

តារាង អថេរ f :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
f			

ដែលគួរចាំ កាលណា f' ដូរសញ្ញាច្រើនដង f ក៏ដូរទិសដៅ (ចុះឡើងច្រើនដងដែរ)
ហើយ កាលណារកសញ្ញា f' ត្រូវរកឫស របស់ f' ឲ្យបានច្រើនបំផុត ។ ម្យ៉ាងទៀត
ដើម្បីគូរក្រាប របស់ f យើងរក ៖

- $f(x)$ ចំពោះ ចំនួន x ទាំងអស់ដែលជាឫស របស់ ដេរីវេ $f'(x)$ ហើយ
 $f(x)$ ដែលរកឃើញ យើងបំពេញ ក្នុងតារាងអថេរ f
- x ដែល $f(x) = 0$ ហើយ x ដែលរកឃើញ យើងបំពេញ ក្នុងតារាងអថេរ f ខាងលើ
មុននឹងគូរក្រាប ។

ទំនាក់ទំនង រវាង លីមីត និង ដេរីវេ

គួរមើលឡើងវិញ នៅជំពូក លីមីត ដើម្បីងាយយល់ ។

ចំណងរវាង លីមីត និង ដេរីវេ ងាយយល់ទេ ៖


និយមន័យ (ដេរីវេត្រង់ x_0)

បើ f ជាអនុគមន៍មួយ កំនត់លើចន្លោះ I ហើយ x_0 ជាចំនួនពិតក្នុង ចន្លោះ I និង h
ជាចំនួនពិតមិនសូន្យ ដែល $x_0 + h \in I$ នោះដេរីវេ នៃ f ត្រង់ x_0 (បើមាន) ជាលីមីតរបស់
អត្រាកំនើននៃអនុគមន៍ f រវាង x_0 និង $x_0 + h$ កាលណា h (ឬ Δx) ខិតទៅរក សូន្យ ។
ចំនួន ដេរីវេ ត្រង់ x_0 កំនត់ដោយ ៖

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{F-IV-01})$$

ដើម្បីងាយយល់និយមន័យ និងរូបមន្តនៃ $f'(x_0)$ នេះ សូមមើលរូបខាងក្រោម (Fig-01) ៖

Fig-01



ចំពោះរូប Fig-01 នេះ (C) ជាក្រាបនៃអនុគមន៍ f ។

x_0 ជាអាប់ស៊ីស របស់ចំណុច $M_0 \in (C)$ ដូច្នេះ $f(x_0)$ ជាអរដោនេរបស់ចំណុច M_0

គឺថា $M_0(x_0; f(x_0))$ ។

ដោយយកកំនើន Δx យើងបាន ចំនួន ថ្មី $x = x_0 + \Delta x$ ហើយ បើ x ជាអាប់ស៊ីស របស់ចំណុច $M \in (C)$ នោះ អរដោនេរបស់ចំណុច M គឺ $f(x)$ ឬ $f(x_0 + \Delta x)$ ឬ ក៏ថា៖ $M(x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x))$ ។

នៅលើ Fig-01, កំនើន Δx ស្មើនឹង h ($\Delta x = h$) ហើយ Δy ជាកំនើន ខាងអនុគមន៍ f នៅពេលដែល x កើនពី x_0 ទៅ $(x_0 + \Delta x)$ បានន័យថា : $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

ដោយចំនួន x_0 នៅដដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ $f(x_0)$ ក៏មិនផ្លាស់ប្តូរដែរ ដូច្នេះ ចំណុច M_0 ក៏នៅនឹងមិនកំរើក មានតែចំណុច M ទេ ដែលកំរើក កាលណា Δx ខិតជិតសូន្យ ព្រោះថា នៅពេលនោះ $(x_0 + \Delta x)$ ក៏ខិតជិត x_0 ដែរ ។ ដោយ M នៅលើក្រាប (C) ដូច្នេះកាលណា Δx ខិតជិតសូន្យ M រត់លើក្រាប (C) ដើម្បីទៅជិត M_0 ហើយ បន្ទាត់ M_0M ក៏ខិតជិតបន្ទាត់ M_0T (មើល Fig-01) ។

បន្ទាត់ M_0T ហៅថា បន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង តាងអនុគមន៍ f ត្រង់ចំណុច M_0 ។

សង្ខេប-1

កាលណា Δx ខិតជិត សូន្យ Δx ទៅជា dx ហើយ Δy ទៅជា dy

dx ហៅថា ឌីផេរ៉ង់ស្យែល នៃ x មើលថា ដេ x

(យើងហៅ Δx ជាកំនើននៃ x ហើយ dx ជាកំនើនតិចបំផុតនៃ x)

dy ហៅថា ឌីផេរ៉ង់ស្យែល នៃ y មើលថា ដេរីវេ

កាលណា Δx ខិតជិត សូន្យ $(f(x + \Delta x) - f(x))$ ខិតជិត df

ដូច្នេះ $\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ ខិតជិត $\frac{df}{dx}$ (df ជាកំនើន នៃ f បន្តពី dx)

បើសរសេរជា ឌីផេរ៉ង់ស្យែល និយមន័យ ដេរីវេ អាចសរសេរ ជា ៖

$$f'(x) = \frac{df}{dx} \Leftrightarrow df = f'(x)dx$$

សង្ខេប-2

ម្យ៉ាងទៀត តាមនិយមន័យដេរីវេ $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

ដូច្នេះ បើសរសេរជា ឌីផេរ៉ង់ស្យែល $f'(x_0) = \frac{dy}{dx}$ ហើយ ដោយតាម Fig-01 $tg(\alpha) = \frac{dy}{dx}$


នោះយើងអាចទាញយក លទ្ធផល ៖ $tg(\alpha) = f'(x_0)$ (F-IV-02)

ដោយមានបន្ទាត់ M_0T និងបន្ទាត់ កាត់តាម M_0 ហើយស្របនឹង អ័ក្ស ox នោះបន្ទាត់ទាំងពីរ នេះកាត់គ្នាត្រង់ M_0 ដោយមានមុំ $\propto$ (មើល Fig-01) ។ ដូច្នេះ កាលណាយើងដឹង M_0 នឹង $\propto$ យើងអាចគូសបន្ទាត់ប៉ះ M_0T ព្រោះយើងដឹងទិសនៃបន្ទាត់មួយទៀតដែលស្របនឹង អ័ក្ស ox រួចទៅហើយ ។

តាមនិយមន័យ នៅក្នុងតំរុយអរតូណរមេ (repère orthonormé) $tg(\alpha)$ ជា

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ M_0T ។ ដោយ $tg(\alpha) = f'(x_0)$ (មើលរូបមន្ត (F-IV-02))

យើងអាចគូសបន្ទាត់ប៉ះ M_0T ដូចតទៅ (នៅក្នុងតំរុយអរតូណរមេ) ៖



មុននឹងគូស យើងមាន $M_0(x_0 ; y_0)$ និង $f'(x_0)$ ហើយបំណងយើងចង់គូរបន្ទាត់ប៉ះ

M_0T ។

1- ជាដំបូងយើងគូរចំនុច M_0

2- ពី M_0 យើងទាញបន្ទាត់ M_0I ស្របនឹងអ័ក្ស ox ហើយមានប្រវែង $\overline{M_0I} = +1$ (មួយឯកតានៃតំរុយអរតូណរមេ)

3- ពីចំនុច I យើងទាញបន្ទាត់ IJ កែងនឹង M_0I ហើយមានប្រវែងពិជគណិតស្មើនឹង $f'(x_0)$

4- បន្ទាត់ប៉ះ ខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ f ត្រង់ M_0 គឺបន្ទាត់ M_0J ព្រោះថា:

$$tg \alpha = \frac{IJ}{M_0I} = \frac{f'(x_0)}{1} = f'(x_0) \text{ ។}$$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះ

ជាទូទៅ កាលណាគេឲ្យ $M_0(x_0 ; y_0)$ និង មេគុណប្រាប់ទិស m នៃបន្ទាត់ យើងអាច

រកសមីការនៃបន្ទាត់នោះដោយប្រើរូបមន្ត ៖

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

ដូច្នេះដោយលទ្ធផលខាងលើនៃបន្ទាត់ប៉ះ សមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ ខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ f ត្រង់

$M_0(x_0 ; y_0)$ គឺ $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ ឬ

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$$

(F-IV-03) ។

ឧទាហរណ៍ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ ត្រង់ចំនុចមានអាប់ស៊ីស $x = 2$ នឹងក្រាបតាង

អនុគមន៍ $f(x) = x^2 - 6x + 4$ ។

$$f(x) = x^2 - 6x + 4 \Rightarrow f(2) = 2^2 - (6 \times 2) + 4 = -4$$

$$f'(x) = 2x - 6 \Rightarrow f'(2) = (2 \times 2) - 6 = -2$$

ដូច្នេះសមីការ (ដោយប្រើ F-IV-03) ៖ $y = -2(x - 2) + (-4)$ ឬ

$$y = -2x$$

។

V- អនុគមន៍ដេរីវ៉ាប (dérivable)

និយមន័យ

ឧបមា f ជាអនុគមន៍មួយ កំនត់លើចន្លោះ I គេថា f ដេរីវ៉ាប (dérivable) លើចន្លោះ I

កាលណា f មាន ដេរីវេ គ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃចន្លោះ I ។

- ក្នុងភាសាបារាំងមានពាក្យខាងចុងថា « អាប » គឺបានន័យថា “អាចបាន” ដូចជា ៖

មីងសាប (mangeable) គឺអាចទទួលទានបាន ដូច្នេះ ដេរីវ៉ាប បានន័យថា អាចរកដេរីវេបាន (គឺថាដេរីវេមាន បើយើងចង់រក អាចរកបាន) ។

– គេថា f ដេរីវ៉ាប (dérivable) ត្រង់ a បើ ៖

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = k \quad (k \text{ ជាចំនួនពិត មិន អនន្ត, } k \in \mathbb{R}) \quad \textbf{(F-V-01)}$$

បានន័យថា លីមីតនោះមាន ហើយជាចំនួនពិតក្នុង $\mathbb{R}$ ទៀត (បើសិនជា $-\infty$ ឬ $+\infty$

នោះមិនអាចថា ដេរីវ៉ាប បានទេ) ។ បើលីមីតនោះមាន ហើយជាចំនួនពិតទៀត

នោះគេអាចសរសេរថា $f'(a) = k$ ។

ឧទាហរណ៍

យើងយក $f(x) = \sqrt{x}$ ($x \geq 0$)

យើងចង់ដឹងថា តើ f ដេរីវ៉ាបទេ ត្រង់ $x = 0$?

ដោយប្រើ **(F-03)** យើងអាចសរសេរ $Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{x}$$

គេគុណ ខាងលើនិងខាងក្រោមដោយ $\sqrt{x}$,

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} \times \sqrt{x}}{x\sqrt{x}}$$

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x\sqrt{x}}$$

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

លីមីតស្មើនឹង $+\infty$ ដូច្នេះមិនមែនជាចំនួនពិតទេ ។ តាមនិយមន័យ អនុគមន៍ រាស្មីនការ

មិនដេរីវ៉ាបទេ ត្រង់ 0 ។

ចុះហេតុអ្វី បានជានៅក្នុងតារាងដេរីវេ $f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$?

ព្រោះរូបមន្តនៅក្នុងតារាង ជារូបមន្តទូទៅ យើងក៏អាចរកឃើញរូបមន្តនេះដែរ ដោយប្រើ

(F-IV-01) ចំពោះចំនុច x មួយក្នុង $\mathbb{R}$, $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ។

យើងតាង៖

$$Z = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

ដោយ $f(x) = \sqrt{x}$

$$Z = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

យើងគុណខាងលើ និងខាងក្រោម ដោយ $(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})$

$$Z = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$


$$Z = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$Z = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$


$$Z = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{ដូច្នេះយើងឃើញរូបមន្តនៅក្នុងតារាងហើយ ។}$$

សង្កេត-ក

កាលណាគេថា $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$



(fig-1)



(fig-2)

បានន័យថា $x \rightarrow a$ ដោយ $x < a$ (fig-1) និង $x \rightarrow a$ ដោយ $x > a$ (fig-2) ។

តែបើ ចន្លោះ កំនត់នៃអនុគមន៍ f ជាចន្លោះបើកដូចជា $I =]a, b[$, នោះដើម្បី រកលីមីត

អនុគមន៍ f ត្រង់ a ឬ b គេត្រូវគិតលីមីត ខាងស្តាំចំពោះ a និងខាងឆ្វេងចំពោះ b

ពោលគឺ ៖

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{និង} \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x) \quad \text{— }]a \text{ — } b[\quad \text{។}$$

$$a < x \quad x \rightarrow b$$

បើគេឃើញ លីមីតនោះជាចំនួនពិតមិនអនន្ត នោះគេថា f មានលីមីត ត្រង់ a ឬ ត្រង់ b ។

សង្កេត-១

យើងបានឃើញហើយកាលណា $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ មាន តាមនិយមន័យលីមីតនោះហៅថា ដេរីវេ $f'(x_0)$ ។ តែនៅពេលខ្លះលីមីតខាងឆ្វេងមាន ហើយលីមីតខាងស្តាំក៏មានទៀត តែលីមីតទាំងពីរនោះមិនស្មើគ្នា ឧបមាដូច $f(x) = |x|$ ៖

$$f(x) = |x| \Rightarrow f(x) = \begin{cases} x & \text{បើ } x \geq 0 \\ -x & \text{បើ } x \leq 0 \end{cases}$$

ដូច្នេះ ត្រង់ $x = 0$, អនុគមន៍ f ប្តូរតម្លៃ ដើម្បីរកដេរីវេត្រង់ $x = 0$ យើងត្រូវបំបែក

និយមន័យដើមវិញ គឺ គេតាង $Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$

a/ ចំពោះ $x \geq 0, f(x) = x$ ដូច្នេះ

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \Rightarrow f'(0_+) = 1 \quad (\text{ក})$$

b/ ចំពោះ $x \leq 0, f(x) = -x$ ដូច្នេះ

$$Z = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x-0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} -1 = -1 \Rightarrow f'(0_-) = -1 \quad (\text{ខ})$$

ដោយ (ក) និង (ខ) យើងឃើញថា ត្រង់ $x = 0$, អនុគមន៍ $f(x) = |x|$, មាន


ដេរីវេខាងខាងស្តាំ (ក) និងដេរីវេខាងឆ្វេង (ខ) ពុំស្មើគ្នា ដូច្នេះតាមនិយមន័យដេរីវេ

អនុគមន៍ f មិនមានដេរីវេទេត្រង់ចំនុច $x = 0$ ។

សង្ខេប

ជាទូទៅ កាលណា ដេរីវេ ខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំ
មិនស្មើគ្នា កន្លះបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងត្រង់ចំណុច
 M_0 មិនអាចជាបន្ទាត់ត្រង់តែមួយបានទេ

ព្រោះមេគុណប្រាប់ទិសដៅនៃកន្លះបន្ទាត់ប៉ះ
ទាំងពីរ មានតម្លៃខុសគ្នា (ដូចរូបខាងស្តាំនេះស្រាប់
ជាក្រាបនៃអនុគមន៍ ជាប់តែមិនដេរីវ៉ាប ត្រង់ M_0)



សង្ខេប-គ

អនុគមន៍ជាប់ និងអនុគមន៍ ដេរីវ៉ាប

- ជាទូទៅ កាលណា $f'(0_+) = \alpha$ និង $f'(0_-) = \alpha$ នៅពេលនោះ គេក៏យក $f'(0) = \alpha$
ហើយគេថា f មានដេរីវេត្រង់ $x = 0$ ។
- ជាទូទៅ កាលណា $f(0_+) = \alpha$ និង $f(0_-) = \alpha$ នៅពេលនោះ គេក៏យក $f(0) = \alpha$
ហើយគេថា f ជាប់ត្រង់ $x = 0$ ។
- គេ សន្មត់ របៀបនេះមិនត្រឹមតែចំពោះ $x = 0$ ប៉ុណ្ណោះទេ គឺគ្រប់តែចំណុច x ទាំងអស់។
- ចំពោះអនុគមន៍ $f(x) = |x|$ អនុគមន៍នេះ ជាប់ត្រង់ $x = 0$ ព្រោះ $|x| = 0$
តែយើងឃើញហើយថា អនុគមន៍នេះមិនដេរីវ៉ាបទេត្រង់ $x = 0$ ។
- ដូច្នេះ អនុគមន៍ជាប់ អាចមិនដេរីវ៉ាប តែបើអនុគមន៍ដេរីវ៉ាប អនុគមន៍នោះ
ជាអនុគមន៍ជាប់។

សង្ខេប-ឃ

តើ $(\Delta x$ និង dx) ហើយ $(\Delta y$ និង dy) ខុសគ្នា ដូចម្តេច?

1- បើនិយាយជាពាក្យធម្មតា Δx ជាហេតុ ហើយ Δy ជាផល

ក៏ដូចគ្នា dx ជាហេតុ ហើយ dy ជាផល

2- បន្ទាប់មក ៖

dx ជាលីមីត របស់ Δx កាលណា Δx ខិតជិត 0 ឬក៏ x ខិតជិត x_0

ដល់ x ខិតជិត x_0 នេះជាហេតុបណ្តាលឲ្យ y ខិតជិត y_0

y ខិតជិត y_0 មានន័យថា $(y - y_0) = \Delta y$ ខិតជិត 0 (សូន្យ) ហើយ

dy ជាលីមីត របស់ Δy កាលណា Δy ខិតជិត 0 ឬក៏ y ខិតជិត y_0 ។

ដោយសង្ខេប ៖

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = f'(x_0) \quad (\text{F-V-ឃ})$$

VI- រូបមន្ត ដេរីវេ នៃអនុគមន៍ខ្លះ ដោយបញ្ជាក់

នៅជំពូក III យើងបានឃើញ តារាងដេរីវេ នៃអនុគមន៍ខ្លះដោយមិនទាន់បង្ហាញ ។

នៅពេលនេះយើងចង់បង្ហាញ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ខ្លះ ដោយប្រើនិយមន័យដេរីវេ ។

a/ ដេរីវេនៃផលបូក $u + v$ នៃអនុគមន៍ u និង អនុគមន៍ v ដេរីវេប ស្មើនឹង ផលបូក

$u' + v'$ ដោយ u' ជាដេរីវេនៃអនុគមន៍ u និង v' ជាដេរីវេនៃអនុគមន៍ v ។

ព្រោះថា៖ យើងតាង

$y = u + v$, ដោយកំនើន Δx យើងបានកំនើន ជាបន្តបន្ទាប់ $\Delta u, \Delta v$ និង $\Delta y = \Delta u + \Delta v$

$$\text{ដូច្នេះ } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta u + \Delta v}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

ហើយដល់ទៅលីមីត យើងបាន ៖

$$y' = u' + v' \quad (\text{F-VI-a})$$

b/ ដេរីវេនៃ $y = uv$ គឺ $y' = u'v + uv'$

ព្រោះថា៖

$$\Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv$$

$$= \Delta u \cdot v + u \cdot \Delta v + \Delta u \cdot \Delta v$$

ដូច្នេះ

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} \cdot v + u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{\Delta u}{\Delta x} \cdot \Delta v$$

ហើយដល់ទៅលីមីត យើងបាន ៖ $y' = u'v + uv'$ (F-VI-b1)

ព្រោះ $\frac{\Delta u}{\Delta x} \cdot \Delta v \rightarrow u' \cdot 0 = 0$)។

សង្កេត

បើ $y = uv$ នឹង $y' = u'v + uv'$

នៅពេលនោះ $\frac{y'}{y} = \frac{u'v + uv'}{uv} = \frac{u'v}{uv} + \frac{uv'}{uv} = \frac{u'}{u} + \frac{v'}{v}$

ដូច្នេះ $\frac{y'}{y} = \frac{u'}{u} + \frac{v'}{v}$ (F-VI-b2) រូបមន្តនេះហៅថាដេរីវេលោការីតមីក

dérivée logarithmique

b-1/ ដេរីវេនៃ $y = au$ (a ជាចំនួនពិតថេរ)

នៅពេលនោះ $y' = au'$ (ព្រោះដេរីវេនៃ a ស្មើនឹង 0)

b-2/ បើ $y = uvw$ គេបាន៖

$$\frac{y'}{y} = \frac{u'}{u} + \frac{v'}{v} + \frac{w'}{w}$$

ព្រោះ $y = uvw = (uv)w$

$$\begin{aligned} y' &= (uv)'w + (uv)w' \\ &= (u'v + uv')w + uvw' \\ &= u'vw + uv'w + uvw' \end{aligned}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \frac{y'}{y} = \frac{u'vw + uv'w + uvw'}{uvw}$$

$$\text{រឺ} \quad \boxed{\frac{y'}{y} = \frac{u'}{u} + \frac{v'}{v} + \frac{w'}{w}} \quad (\text{F-VI-b3})$$

រូបមន្តនេះ ថ្លែងថា ៖ ដេរីវេលោការីតមីកនៃផលគុណ ជាផលបូកនៃដេរីវេ

លោការីតមីក របស់កត្តានីមួយៗ ។

c/ គេឱ្យ $y = \frac{u}{v}$

យើងអាចសរសេរ $u = yv$ ហើយបើ y ដេរីវេនោះ គេបាន ៖

$$u' = y'v + yv'$$

$$u' = y'v + \frac{u}{v}v' \Rightarrow y'v = u' - \frac{uv'}{v}$$

$$y'v = \frac{u'v - uv'}{v}$$

$$y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$\boxed{y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}} \quad (\text{F-VI-c1})$$

ដោយរូបមន្ត យើងទាញយក ដេរីវេលោការីតមីកនៃផលចែក ៖

$$\frac{y'}{y} = \frac{\frac{u'v - uv'}{v^2}}{\frac{u}{v}} = \frac{u'v - uv'}{v^2} \times \frac{v}{u}$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{(u'v - uv')v}{v^2u}$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{u'}{u} - \frac{v'}{v}$$

$$\boxed{\frac{y'}{y} = \frac{u'}{u} - \frac{v'}{v}} \quad (\text{F-VI-c2})$$

រូបមន្តនេះ ថ្លែងថា ៖ ដេរីវេលោការីតមីកនៃផលចែក ជាផលសង្ខេប ដេរីវេលោការីតមីកនៃភាគយក និង ដេរីវេលោការីតមីកនៃភាគបែង ។

d/ $y = u^m$ ដោយ $m \in \mathbb{Q}$ ($m = \frac{p}{q}$ ជាដើម)

ដើម្បីទៅដល់ដេរីវេ នៃ $y = u^m$ ($m \in \mathbb{Q}$) យើងនឹងបង្ហាញតាមសំដាប់ដូចតទៅ៖

ក- ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = x^m$ ដោយ $m \in \mathbb{N}$

នៅពេលនេះ យើងប្រើរបៀបបញ្ជាក់មួយ ដែលគេច្រើនប្រើកាលណារូបមន្តដែលត្រូវបញ្ជាក់ មានចំណងជាប់ជាមួយនឹងចំនួនគត់ ក្នុង $\mathbb{N}$ ។ ដូចជានៅពេលនេះជាដើម

ក្នុង $y = x^m$, m ជាចំនួនគត់ក្នុង $\mathbb{N}$ ។

របៀបបញ្ជាក់នេះ បារាំងហៅថា démonstration par récurrence ខ្ញុំសូមទុកពាក្យនេះដដែលសិន បើសិនជាពុំទាន់មានប្រើជាភាសាខ្មែរ ដោយខ្ញុំហៅថា បញ្ជាក់ដោយវេតារីង ដែលមានដំណើរដូចតទៅ ៖

បញ្ជាក់ដោយវេតារីង (F-VI-d1)

1/ ឧបមារូបមន្ត $F1$ ត្រូវ ចំពោះ $n = 1$

2- គេសន្មតថា រូបមន្តនោះ ត្រូវរហូតដល់ $n = n$ គឺ គេសន្មតថា $F2, F3, F4, \dots, Fn$

ត្រូវទាំងអស់ បានន័យថា គេអាចប្រើ រូបមន្ត ចាប់តាំងពី $F1, F2, F3, \dots, Fn$ ទៅបាន

3- គេត្រូវបង្ហាញថា រូបមន្តនោះ ក៏ត្រូវចំពោះ ជួរ $n+1$ ដែរ ។

បន្ទាប់ទៅនេះ យើងប្រើ បញ្ជាក់ដោយវេតារីង ដើម្បីបង្ហាញថា អនុគមន៍

$y = x^m$, m ជាចំនួនគត់ក្នុង $\mathbb{N}$ មានដេរីវេ $y' = mx^{m-1}$ គឺថា

$y = x^m \quad (m \in N) \Rightarrow y' = mx^{m-1}$	(F-VI-d2)
---	------------------

1- យើងត្រូវរក ដេរីវេ នៃអនុគមន៍ចំពោះ $m = 1$ គឺថា $y = x$

ដើម្បីរកដេរីវេ នៃ $f(x) = x$ យើងប្រើនិយមន័យដេរីវេ គឺយើងរក

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)-(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$

ដូច្នេះ $y = x \Rightarrow y' = 1$ ដូច្នេះ **(F-VI-d2)** ត្រូវចំពោះ $m = 1$

2- យើងសន្មតថារូបមន្ត **(Fm)** ត្រូវរហូតដល់ $m = m$

3- យើងត្រូវបង្ហាញថា **(Fm)** ក៏ត្រូវចំពោះ $m + 1$ ដែរ គឺថា ដោយប្រើសម្មតិកម្មខាងលើ

យើងត្រូវបង្ហាញថា $y = x^{m+1} \Rightarrow y' = (m+1)x^m$ **(F-VI-d3)** $y = x^{m+1}$

អាចសរសេរជា

$$y = x^m \times x$$

ដោយយក :

$$u = x^m \Rightarrow u' = mx^{m-1} \text{ (ដោយ (F-VI-d2))}$$

$$v = x \Rightarrow v' = 1$$

$$y = u \times v$$

$$y' = u'v + uv'$$

$$y' = (mx^{m-1})x + x^m$$

$$y' = mx^m + x^m$$

$$y' = (m+1)x^m \text{ នេះបង្ហាញថា (F-VI-d3) ក៏ត្រូវដែរ ។}$$

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន : រូបមន្ត **(Fm)** ត្រូវគ្រប់ $m \in N$ ។

សង្កេត

ហេតុអ្វីក៏គេហ៊ាន ថា **(Fm)** ត្រូវគ្រប់ $m \in N$ បើគ្រាន់តែសង្កេតឃើញថាត្រូវត្រឹមតែ $m = 1$

សោះ ។ យើងឆ្លើយថា ដោយសារការបង្ហាញ ចំណុចទី 3- នេះហើយ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ

យើងហ៊ានអះអាងយ៉ាងនេះ ។

ព្រោះថាដោយការបង្ហាញទី 3- ប្រើប្រាស់មន្ត្រីដល់ជួរ m វាក៏ត្រូវដល់ ជួរទី $m+1$ ដែរ
 ដូច្នេះបើត្រូវចំពោះ $m=1$ វាក៏ត្រូវចំពោះ $m+1=2$ ដែរ
 ហើយបើត្រូវចំពោះ $m=2$ វាក៏ត្រូវចំពោះ $m+1=3$ ដែរ
 ហើយបើត្រូវចំពោះ $m=3$ វាក៏ត្រូវចំពោះ $m+1=4$ ដែរ
។ល។

ហេតុនេះហើយ បានជាថាត្រូវ $\forall n \in \mathbb{N}$ ។

ខ- ដេរីវេ នៃអនុគមន៍ $y = x^m$ ដោយ $m \in \mathbb{Q}$ (សំនុំចំនួនសនិទាន)

ខ-1 / $m \geq 0$

$m \in \mathbb{Q}$ យើងអាចយក $m = \frac{p}{q}$ ដោយ $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}$

ដូច្នេះ y ទៅជា $y = x^{\frac{p}{q}} \Rightarrow y^q = (x^{\frac{p}{q}})^q$

$$\text{រឺ} \quad y^q = x^p$$

$y^q = x^p \Rightarrow$ ដោយធ្វើដេរីវេទាំងសងខាង ដោយយក x ជាអថេរ យើងបាន៖

$qy^{q-1}y' = px^{p-1}$ (ដោយប្រើដេរីវេអនុគមន៍បណ្តាក់ y^q ផង និង ដោយប្រើមន្ត្រី

(F-VI-d2) ផង ព្រោះ $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}$) ។

ចូរសង្កេត ថា (R-VI-01) (R = Remarque)

$y = x^{\frac{p}{q}}$ ជាអនុគមន៍ មានអថេរ x តែបើយើងតាង $z = y^q$ នោះយើងឃើញថា z មានអថេរ y ហើយ y មានអថេរ x ។ ហេតុនេះហើយ បានជាមាន y' នៅពេលដែល យើងធ្វើដេរីវេ នៃអនុគមន៍ y^q ។

ការសង្កេតនេះសំខាន់ណាស់ ចូរខិតខំ ដើម្បីនឹងបានយល់ឲ្យច្បាស់ ព្រោះដេរីវេនៃ អនុគមន៍បណ្តាក់នេះ យើងនឹងជួបជាញឹកញាប់ ។

$$qy^{q-1}y' = px^{p-1} \Rightarrow y' = \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}}$$

$$y' = \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}}$$

ឆ្លើយ

$$y' = \frac{p}{q} \times x^{p-1} \times y^{1-q} \quad (1)$$

$$\text{ដោយ } y = x^{\frac{p}{q}} \Rightarrow y^{1-q} = \left[x^{\frac{p}{q}} \right]^{1-q} \quad (2)$$

$$\text{ដោយប្រើប្រាស់មន្ត្រី : } (x^m)^n = x^{mn} \quad \text{និង } x^m \times x^n = x^{m+n}$$

$$(1) \text{ និង } (2) \text{ ផ្គុំ :}$$

$$y' = \frac{p}{q} \times x^{p-1} \times \left[x^{\frac{p}{q}} \right]^{1-q}$$

$$y' = \frac{p}{q} \times x^{p-1} \times x^{\frac{p(1-q)}{q}}$$

$$y' = \frac{p}{q} \times x^{p-1 + \frac{p(1-q)}{q}}$$

$$y' = \frac{p}{q} \times x^{p-1 + \frac{p-pq}{q}}$$

$$y' = \frac{p}{q} \times x^{p-1 + \frac{p}{q} - p}$$

$$y' = \frac{p}{q} \times x^{\frac{p}{q} - 1}$$

$$\text{ដូច្នេះ : យើងបានប្រើប្រាស់មន្ត្រី } y = x^{\frac{p}{q}} \quad (p \in N, q \in N) \Rightarrow y' = \frac{p}{q} x^{\frac{p}{q} - 1}$$

$$\text{ឆ្លើយ } y = x^m \Rightarrow y' = mx^{m-1} \quad (m \geq 0 \text{ និង } m \in Q) \quad (3)$$

2-2/ m < 0

$$\text{បើ } m < 0 \text{ យើងតាង } m = -n \text{ ដូច្នេះ : } n \geq 0 \text{ និង } n \in Q$$

$$y = x^m = x^{-n} = \frac{1}{x^n} \Rightarrow y \times x^n = 1$$

$$y \times x^n = 1 \Rightarrow (y \times x^n)' = 0 \text{ (ដោយយកដេរីវេទាំងសងខាង)}$$

ដោយរូបមន្តដេរីវេ $(uv)' = u'v + uv'$, យើងអាចសរសេរ

$$\begin{aligned} (y \times x^n)' &= y'x^n + y(x^n)' \\ &= y'x^n + y(nx^{n-1}) \text{ ដោយ (3)} \\ &= y'x^n + x^{-n}(nx^{n-1}) \\ &= y'x^n + nx^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } (y \times x^n)' = 0 \Rightarrow y'x^n + nx^{-1} = 0, \text{ រឺ}$$

$$y' = \frac{-nx^{-1}}{x^n} = -n x^{-n-1} = m x^{m-1}$$

ដូច្នេះ:

$$y = x^m \Rightarrow y' = mx^{m-1} \text{ (} m < 0 \text{ នឹង } m \in Q \text{)} \quad (4)$$

រួមសេចក្តីទៅ ដោយ (3) និង (4) យើងបានរូបមន្ត រួមតែមួយ ៖

$$y = x^m \Rightarrow y' = mx^{m-1} \text{ ដោយ } m \in Q \quad (\text{F-VI-d4})$$

ដោយ $N \subset Z \subset Q$ ដូច្នេះ (F-VI-d4) ជារូបមន្តរួម ប្រើបានចំពោះ m នៅក្នុង N, Z រឺ Q ។

VII- រូបមន្ត ដេរីវេ នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ក- ដេរីវេនៃ $y = \sin x$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} \\ &= \frac{\sin x \cosh + \sinh \cos x - \sin x}{h} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sin x (\cosh - 1) + \sinh \cos x}{h}$$

$$= \sin x \frac{(\cosh - 1)}{h} + \cos x \frac{\sinh}{h}$$

កាលណា $h \rightarrow 0$, $\frac{(\cosh - 1)}{h} \rightarrow 0$ ហើយ $\frac{\sinh}{h} \rightarrow 1$	⁽²⁾ (F-VII-01)
---	---------------------------

ដូច្នេះ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = (\sin x \times 0) + (\cos x \times 1) = \cos x$

ដូច្នេះរូបមន្ត ដេរីវេ គឺ

$y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$	(F-VII-02)
$y = \sin u \Rightarrow y' = \cos u \times u'$	

ដោយ សង្កេត - (R-III-01))

ខ- ដេរីវេនៃ $y = \cos x$

យើងអាចសរសេរ ៖

$$\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(\cos x)' = \left(\sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right)'$$

ដោយប្រើរូបមន្តដេរីវេ អនុគមន៍ $\sin x$ (F-VII-02)

$$\left(\sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right)' = \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$$

ដោយ $\cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = -\sin x$, ដូច្នេះ ៖

$y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$	(F-VII-03)
$y = \cos u \Rightarrow y' = -\sin u \times u'$	

ដោយ សង្កេត - (R-III-01))

² សូមសន្មតសិនចុះ ចំពោះលីមីតទាំងពីរនេះ យើងនឹងបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយ ។

គ- ជំរឿននៃ $y = \tan x$

$$y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (y \text{ មានទំរង់ } \frac{u}{v})$$

$$y' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x}$$

$$y' = \frac{(\cos x) \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x}$$

$$y' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$y = \tan x \Rightarrow y' = 1 + \tan^2 x$	(F-VII-04)
--	-------------

ឃ- ជំរឿននៃ $y = \cotan(x)$

$$y = \cotan x$$

$$y = \frac{\cos x}{\sin x} \Rightarrow y' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x}$$

$$y' = \frac{-1}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$y' = -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x}$$

$$y' = -(1 + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x})$$

$$y' = -(1 + \cotan^2 x)$$

$y = \cotan x \Rightarrow y' = -(1 + \cotan^2 x)$	(F-VII-05)
---	-------------

សង្កេត

រូបមន្តខាងលើ បានឡើងដោយសន្មតថា x ជារ៉ាដ្យង់ ។

បើ x ជា ដឺក្រេ នោះត្រូវផ្លាស់មក រ៉ាដ្យង់ វិញ ដោយវិធី ៖

$$180^\circ \rightarrow \pi \quad (\text{រ៉ាដ្យង់})$$

$$1^\circ \rightarrow \frac{\pi}{180}$$

$$x^\circ \rightarrow \frac{\pi \times x}{180}$$

ដូច្នេះ បើ t ជារ៉ាដ្យង់ យើងមាន សម្ព័ន្ធរវាង x ជាដឺក្រេ និង t ជារ៉ាដ្យង់ ៖

$$t = \frac{\pi \times x}{180}$$

$$t = \frac{\pi \times x}{180} \quad \text{ដោយ } x \text{ ជាដឺក្រេ}$$

(F-VII-06)

និង t ជារ៉ាដ្យង់

ឧទាហរណ៍

ដោយគេដឹង x ជាដឺក្រេ គេបាន t ជារ៉ាដ្យង់ ដោយប្រើ (F-VII-06)

$$x = 60^\circ \Rightarrow t = \frac{\pi \times 60}{180} = \frac{\pi}{3}$$

ង- អនុគមន៍ អាំងសេចទីវ (injective) សៀសេចទីវ (surjective) និង ប៊ីសេចទីវ (bijective)

និយមន័យ

ក-គេថាអនុគមន៍ g អាំងសេចទីវ

លុះត្រាតែបើកាលណា គ្រប់រូបភាព នៃសំនុំចុង បើគូនឹងធាតុ នៃសំនុំដើម នោះមានយ៉ាង ច្រើនមួយ ។ (បានន័យថា អាចមានរូបភាព ដែលគ្មានធាតុដើមជាគូ)។

បើសរសេរជាគណិតសាស្ត្រ ៖

$$\forall x_1, x_2 \in \text{ដែនកំនត់}(g) : g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

ឧទាហរណ៍ អនុគមន៍ អាំងសេចទីវ

1/ $f(x) = x$ ព្រោះ $f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$

2/ $f(x) = x^3$ ព្រោះ $f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1^3 = x_2^3 \Rightarrow$

$$(x_1^3 - x_2^3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = 0 \Rightarrow$$

$$(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$$




Fig-1

ខ-គេថាអនុគមន៍ f សៀសេចទីវ

លុះត្រាតែបើកាលណា គ្រប់រូបភាព នៃសំនុំចុង យ៉ាងហោចណាស់ ក៏មានគូនឹងធាតុ នៃសំនុំដើម មួយដែរ ។ (បានន័យថា ចំនួនធាតុនៃសំនុំដើម ច្រើនឬក៏ស្មើនឹងចំនួនធាតុនៃសំនុំចុង) ។

បើសរសេរជាគណិតសាស្ត្រ ៖

$$\forall y \in \text{សំនុំរូបភាព}(f) (\exists x / f(x) = y)$$

ឧទាហរណ៍ អនុគមន៍ សៀសេចទីវ




Fig-2

$f(x) = \sin x$, $x \in [-\pi, +\pi]$ ព្រោះ $\forall y \in [-1, 1], \exists x / \sin x = y$ (1)។

ដោយយើងដឹង y ដូច្នេះ យើងអាចរកមុំ $\propto$ មួយក្នុងចន្លោះ $[-\pi, +\pi]$ ដែលមាន $\sin \alpha = y$

ហើយដើម្បីរក x យើងប្រើ (1) ដោយសរសេរ $\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = \alpha$ និង $x = \pi - \alpha$

ដោយ $\alpha \in [-\pi; +\pi]$ នោះ $(\pi - \alpha)$ ក៏នៅក្នុងចន្លោះ $[-\pi; +\pi]$ ដែរ។ ដូច្នេះ កាលណាគេឲ្យ y

យើងអាចរកចំនួន x បានជានិច្ច។ តាមនិយមន័យ អនុគមន៍ f កំនត់ដោយ $f(x) = \sin x$

ជាអនុគមន៍សៀសចរ។ ចូលមើលក្រាប $\sin(x)$ ខាងក្រោម គួរក្នុងចន្លោះ $[-2\pi; +2\pi]$ ៖




Fig-3

ក្នុងឃ្លា (1) ថា $\forall y \in [-1, 1], \exists x / \sin x = y$ មានន័យថា យើងមាន y ។ ដូច្នេះដោយ y យើងគួរ
បន្ទាត់ D_y ស្របនឹងអ័ក្ស $_{ox}$ យើងឃើញថា បន្ទាត់នោះកាត់ ក្រាប (Fig-3) ជាច្រើនចំនុច
ដូចជាចំនុច អាប់ស៊ីស $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ជាដើម នៅក្នុងចន្លោះ $[-2\pi; 2\pi]$ តែបើនៅក្នុងចន្លោះ
 $[-\pi; +\pi]$ វិញ នោះមានតែ អាប់ស៊ីស α_2, α_3 ប៉ុណ្ណោះ។ ដោយជាក្រាប នៃអនុគមន៍ sinus នោះ
 $\sin \alpha_2 = y$ និង $\sin \alpha_3 = y$ ហេតុនេះហើយបានជាយើងហ៊ានថា $\forall y \in [-1; 1], \exists x / \sin x = y$
ព្រោះ x ដែលមានគឺ α_2, α_3 បើគេកម្រិតក្រាប តែក្នុង ចន្លោះ $[-\pi; +\pi]$ ។

គ-គេថាអនុគមន៍ h ប៊ីសេចទ័រ លុះត្រាតែ ជាអនុគមន៍ អាំងសេចទ័រ
ផង និង សៀសចរ ថែមទៀត។ (បានន័យថា ចំនួនធាតុនៃសំនុំ
ដើម និងចំនួនធាតុនៃសំនុំចុង ស្មើគ្នា)។ បើសរសេរជាគណិតសាស្ត្រ ៖
 $\forall x_1, x_2 \in$ ដែនកំនត់(h) : $h(x_1) = h(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

ហើយនិង

$\forall y \in$ សំនុំរូបភាព(h) ($\exists x / h(x) = y$) ។ សង្កេត ៖ អនុគមន៍ខ្ទប់
ពុំអាច ប៊ីសេចទ័រ បានទេ (មើល Fig-3) ។




Fig-4

សង្ខេប-1

-បើយើងមើល Fig-1 យើងឃើញថា អនុគមន៍នោះគ្រាន់តែ អាំងសេចទីវ តែមិនទាន់ ស្ប៉េសេចទីវ ទេ ព្រោះនៅក្នុងសំនុំរូបភាព នៅសល់ធាតុខ្លះដែលអត់គូជាមួយនឹងធាតុនៃសំនុំដើម ។

-បើយើងមើល Fig-2 យើងឃើញថា អនុគមន៍នោះគ្រាន់តែ ស្ប៉េសេចទីវ តែមិនទាន់ អាំងសេចទីវ ទេ ព្រោះមានធាតុខ្លះក្នុងសំនុំរូបភាព មានគូលើសពីមួយ ក្នុងសំនុំដើម ។

- តាមនិយមន័យ ប៊ីសេចទីវ ដើម្បីឲ្យ Fig-1 ទៅ ជា Fig-4 ទាល់តែក្នុងសំនុំ Y គ្មានសល់ធាតុអត់គូ បានន័យថាត្រូវដូច Fig-2 ថែមទៀត ។ រួមសេចក្តីទៅ គឺ ត្រូវដូច Fig-1 ផង និងដូច Fig-2 ផង ឬក៏ថា អាំងសេចទីវផង និង ស្ប៉េសេចទីវទៀត ។

ឧទាហរណ៍ ម្យ៉ាងទៀតចំពោះ អាំងសេចទីវ ស្ប៉េសេចទីវ និង ប៊ីសេចទីវ

យើងតាងដោយ X សិស្ស ថ្នាក់ ទី១០ ហើយ Y មុខវិជ្ជាខាងកីឡានិងសិល្បៈដែលសិស្សត្រូវយកមុខវិជ្ជាណាមួយ ក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំងឡាយដែលសាលាស្នើឲ្យជ្រើសរើស ។
លក្ខខ័ណ្ឌគឺ:

១- សិស្សម្នាក់យកមុខវិជ្ជាបានតែមួយគត់ ឧបមាថាបើបានយកការហែលទឹកហើយ នោះពុំអាចយកមុខវិជ្ជាអ្វីផ្សេងទៀតបានឡើយ ។

២- មុខវិជ្ជាណា ក៏សិស្សអាចរើសបានដែរ ។

បើគេតាង ដោយ m ចំនួនសិស្ស ទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់ទី១០ និង n ចំនួនមុខវិជ្ជា កីឡានិងសិល្បៈ ទាំងអស់ដែលសាលាមាន ហើយ f ជាអនុគមន៍ពី X ទៅ Y តើត្រូវថែមលក្ខខ័ណ្ឌ អ្វីទៀត ដើម្បីឲ្យ f ទៅ ជាអនុគមន៍ អាំងសេចទីវ ស្ប៉េសេចទីវ និងប៊ីសេចទីវ?

ឆ្លើយ

មុននឹងឆ្លើយ គួរសង្កេតថា លក្ខខណ្ឌទី១ ជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃអនុគមន៍ទូទៅ ទាំងអស់ ព្រោះថាធាតុដើមមួយ មិនអាច (ដោយអនុគមន៍) មានរូបភាព ដល់ទៅ ពីរ ទេ ។ នេះជានិយមន័យរបស់អនុគមន៍ទាំងអស់ ។ តែ រូបភាពមួយ អាចមាន ធាតុដើមច្រើន ។

១- f ទៅ ជាអនុគមន៍ អាំងសេចទីវ

ដោយមើល Fig-1 f ទៅជាអនុគមន៍ អាំងសេចទីវ បើសិស្សតិច ហើយមុខវិជ្ជាច្រើន (គឺ $m \leq n$) និង សិស្សម្នាក់ៗ ត្រូវយកមុខវិជ្ជាខុសគ្នា ។

២- f ទៅ ជាអនុគមន៍ ស្បៀសេចទីវ

ដោយមើល Fig-2 f ទៅជាអនុគមន៍ ស្បៀសេចទីវ បើសិស្សច្រើន ហើយមុខវិជ្ជាតិច (គឺ $m \geq n$) ។

៣- f ទៅ ជាអនុគមន៍ ប៊ីសេចទីវ

ដោយមើល Fig-4 f ទៅជាអនុគមន៍ ប៊ីសេចទីវ បើចំនួនសិស្ស និង ចំនួនមុខវិជ្ជាស្មើគ្នា (គឺ $m = n$) និង សិស្សម្នាក់ៗ ត្រូវយកមុខវិជ្ជាខុសគ្នា ។

(ម្យ៉ាងទៀត [តាម ១- ($m \leq n$) និង តាម ២- ($m \geq n$)] $\Rightarrow m = n$)

សង្កេត-2

យើងអាច ប្តូរអនុគមន៍ អាំងសេចទីវ ឲ្យទៅជា ប៊ីសេចទីវ ដោយបន្ថយធាតុក្នុង សំនុំចុង Y ឧទាហរណ៍

$X = \{1, 2, 3, 4\}$; $Y = \{a, b, c, d, e, k, p\}$; អនុគមន៍ f ពី X ទៅ Y

$f : X \longrightarrow Y$ កំនត់ដោយ : $f(1) = a$, $f(2) = c$, $f(3) = d$, $f(4) = p$

យើងឃើញថា បើយើងតាង Y_1 ជាសំនុំរូបភាព(f) នោះ $Y_1 = \{a, c, d, p\}$

គឺ $Y1$ បានដោយដកពី Y នូវធាតុ d, e, k ចេញ នៅពេលនោះ f ជាអនុគមន៍ អាំងសេចទីវ ពី X ទៅ $Y1$ ។

សង្កេត-3

យើងធ្លាប់ជួយមកហើយ កាលណាយើងគូរក្រាប នៃ អនុគមន៍ f ណាមួយ ក្រាបនោះច្រើនតែ ឡើងចុះ ឡើងចុះ ហើយបើឡើងដល់កំពូលវាក៏ចុះមកវិញ (ដូចជីវិតនៃយើងគ្រប់គ្នាដែរ)

ហើយបើយើងកម្រិតយកតែ ចន្លោះ $I = [a ; a+\alpha]$ ដែលអនុគមន៍នោះឡើង និង

$J = [f(a), f(a+\alpha)]$ នៅពេលនោះ យើងបាន អនុគមន៍ f ប៊ីសេចទីវ ពី I ទៅ J ។

សូមជ្រាបថា នៅក្នុងចន្លោះ I ដែលអនុគមន៍នោះចុះ ក៏បានដែរ នៅពេលនោះ យើងយក

$J = [f(a+\alpha), f(a)]$ ។ ដោយបន្ថយដែនកំណត់ អនុគមន៍ជាប់ធម្មតា អាចទៅជា


អនុគមន៍ប៊ីសេចទីវបាន ។

រួមសេចក្តីទៅ:

កាលណាគេបន្ថយ ដែនកំណត់ ត្រឹមតែចន្លោះ I ដែលអនុគមន៍ f កើនជានិច្ច ឬ ចុះជានិច្ច គេអាចធ្វើ f ឱ្យក្លាយទៅជាអនុគមន៍ ប៊ីសេចទីវ ពី I ទៅ $f(I)$ បើសិន f ជេរវ៉ាបលើ I ។

(R-VII-02)

ការសង្កេតនេះមានប្រយោជន៍ ចំពោះការសិក្សា អនុគមន៍ប្រាស ព្រោះថាដើម្បី អនុគមន៍ f មានអនុគមន៍ ប្រាស f^{-1} លុះត្រាតែ f ជាអនុគមន៍ ប៊ីសេចទីវ ព្រោះតាមនិយមន័យ



(Fig-5)

$$y = f(x) \quad \Leftrightarrow \quad x = f^{-1}(y)$$

(F-VII-07)

យើងគួរសួរដែរ ហេតុអ្វីបានជា f ត្រូវ បីសេចក្តីសិន ទើបមាន អនុគមន៍ ប្រាស f^{-1} ?
 ព្រោះឧបមា f គ្រាន់តែ សៀសេចក្តី នោះ y តែមួយ អាចមានជាតុដើមដល់ទៅ ពីរ ក៏បាន
 ចូរមើល (Fig-2) ដូចជា $y = f(x_1)$ និង $y = f(x_2)$ ដូច្នេះ ដោយ (F-VII-07)
 $y = f(x_1) \Rightarrow f^{-1}(y) = x_1$ ហើយ $y = f(x_2) \Rightarrow f^{-1}(y) = x_2$ បានន័យថា
 ចំពោះ f^{-1} ជាតុ y តែមួយ មានរូបភាពដល់ទៅពីរ គឺ x_1 និង x_2 ដែលខុសពីនិយមន័យ
 ទូទៅនៃអនុគមន៍ មើល (R-VII-01) ។

ច- អនុគមន៍ $y = \text{Arcsin}(x)$ និងអនុគមន៍ $y = \text{Arccos}(x)$




Fig-6: $y = \text{Arcsin}(x) \Leftrightarrow \sin(y) = x$ (F-VII-08)
 (ពាក្យបារាំង Arc ប្រែថា ធ្នូ រាងកោងដូចរង្វង់មណ្ឌល)
 អនុគមន៍ Arc sinus ជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ប្រាស
 នឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ sinus (ស៊ីនុស) កម្រិតត្រឹម
 តែចន្លោះ $J = [-\frac{\pi}{2}; +\frac{\pi}{2}]$ ។ Arc sinus នៃចំនួន x គឺជា មុំ
 y សំដែងជារង្វង់ នៃចន្លោះ $[-\frac{\pi}{2}; +\frac{\pi}{2}]$ ហើយដែលមាន
 sinus ស្មើនឹង x ($\sin(y) = x$) ។ ឧទាហរណ៍
 $\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \frac{\pi}{3} = \text{Arcsin}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ បានន័យថា $\frac{\pi}{3}$ ជា Arc ជា
 ផ្នែកនៃរង្វង់មូល រឺ មុំជារង្វង់ ដែលមានស៊ីនុសស្មើនឹង $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ។




Fig-7: $y = \text{Arccos}(x) \Leftrightarrow \cos(y) = x$ (F-VII-09)
 អនុគមន៍ Arc cosinus ជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
 ប្រាសនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ cosinus (កូស៊ីនុស)
 កម្រិតត្រឹមតែចន្លោះ $[0; +\pi]$ ។ Arc cosinus នៃចំនួន x គឺជា
 មុំ y សំដែងជារង្វង់ នៃចន្លោះ $[0; +\pi]$ ហើយ
 ដែលមាន cosinus ស្មើនឹង x ($\cos(y) = x$) ។

ឧទាហរណ៍ យើងដឹងថា $\sin(x) = \cos(\frac{\pi}{2} - x)$ ព្រោះ $[(x) + (\pi/2 - x)] = \frac{\pi}{2}$ ។ យើងតាង $t = \sin(x) \Rightarrow x = \text{Arcsin}(t)$ ដោយ (F-VII-08) ហើយ $t = \cos(\frac{\pi}{2} - x) \Rightarrow \frac{\pi}{2} - x = \text{Arccos}(t)$ ដូច្នេះ យើងបានរូបមន្ត៖ $\text{Arcsin}(t) + \text{Arccos}(t) = x + (\frac{\pi}{2} - x)$ រឺ $\text{Arcsin}(t) + \text{Arccos}(t) = \frac{\pi}{2}$ ។

៩ - $y = \text{Arctan}(x)$

និយមន័យ

អនុគមន៍ តង់សង់ ($\tan$) ជាប់ និង កើនជាដាច់ខាត លើចន្លោះ $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ ហើយថែមទាំង

បីសេចក្តីពី $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ ទៅ R ។ ដូច្នេះ ក៏មានអនុគមន៍ ប្រាស ហៅថា

"អាកតង់សង់" (*Arctangente*) សរសេរជា **Arctan** ដែល បីសេចក្តីពី R ទៅ $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ ។

$$y = \text{Arctan}(x) \Leftrightarrow x = \tan y \text{ និង } y \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$$

នៅពេលនេះយើងនឹងសិក្សា អនុគមន៍ $y = \tan(x)$ និង $x = \text{Arctan}(y)$ ឲ្យបានល្អិតល្អន

បន្តិចៗ ក្នុង ពាក្យ *Arctan* គេសរសេរ A (ជាអក្សរធំ) ព្រោះតង់សង់ ជាអនុគមន៍ខួប ហើយ

ចំពោះអនុគមន៍ប្រាស គេកម្រិតយកតែខួបនៅក្នុងចន្លោះ $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ តែប៉ុណ្ណោះ ។

$$Y = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

1-រកខួប

$$\tan(x+\pi) = \frac{\sin(x+\pi)}{\cos(x+\pi)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = \tan(x) \Rightarrow \text{អនុគមន៍ } \tan \text{ ជាអនុគមន៍ខួប ហើយ}$$

$$\text{មួយខួប} = \pi$$

2-រកអ័ក្សធំ៖

$$\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} = -\tan(x) \Rightarrow \text{អនុគមន៍ } \tan \text{ ជាអនុគមន៍ សេស}$$

ដូច្នេះ ក្រាប $\tan$ ឆ្លុះធៀបនឹង គល់ ០

3-រកដែនកំណត់

$$Y = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad \text{មិនកំណត់កាលណា } \cos(x) = 0$$

$$\cos(x) = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{2}$$

ដោយ π ជាខួប និង $Y = \tan(x)$ ជាអនុគមន៍ស៊ីសេស ដូច្នេះ យើងយកដែនកំណត់ ប្រវែងមួយខួប

ដោយ មានគល់ ០ នៅកណ្តាល ហើយគ្មាន $x = \pm \frac{\pi}{2}$ ពេលគឺ $D =]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$

4-រកដេរីវេ

$$Y = \tan(x) \Rightarrow Y' = 1 + \tan^2(x) > 0$$

5-តារាងអថេរភាព $y = \tan(x)$ (T1)

	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
x					
y'		+	+	+	
$y = \tan(x)$	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$

6-តារាងអថេរភាព $x = \text{Arctan}(y)$ (T2)

	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
(x) y					
(y') x'		+	+	+	
(y = Arctan(x))		$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$x = \text{Arctan}(y)$	$-\frac{\pi}{2}$				

(x) (y') (y = Arctan(x)) ជាអថេរដែលត្រូវប្រើ ដើម្បីគូរក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរ ក្នុងតំរុយតែមួយ។

យើងសង្កេត មើលតារាង (T1) និង (T2)

ចំពោះ (T1), $y = \tan(x)$ បានន័យថា x ជាធាតុដើម ហើយ y ជាធាតុចុង


ចំពោះ (T2), $x = \text{Arctan}(y)$ បានន័យថា y ជាធាតុដើម ហើយ x ជាធាតុចុង

ដូចនេះ បើនៅក្នុងតំរុយតែមួយ យើងតាង C1 ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan(x)$ និង C2

ក្រាបនៃអនុគមន៍ $x = \text{Arctan}(y)$ បើចំណុច M(x,y) នៅលើ C1 នោះចំណុច N(y,x) ត្រូវនៅលើ C2


គឺថា ចំពោះ ចំណុច M និង N អាបស៊ីស និង អរដោនេ ផ្លាស់ប្តូរគ្នា (អាបស៊ីសនៃ M ទៅជា អរដោនេនៃ N ហើយអរដោនេនៃ M ទៅជាអាបស៊ីសនៃ N) : ហេតុនេះហើយ បានជាគេថា

ក្រាប C1 និង ក្រាប C2 ឆ្លងគ្នា ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។ ដូចក្រាបខាងក្រោមនេះ៖



ជ- ដេរីវេនៃ អនុគមន៍ប្រាស f^{-1}

យើងដឹងហើយ និយមន័យ នៃអនុគមន៍ប្រាស គឺ ៖



ដោយ (2) យើងធ្វើដេរីវេ (ទាំងសងខាង សញ្ញា =) ដោយយក x ជាអថេរ យើងបាន៖

$$x'(x) = (f^{-1})'(y) \times y'(x)$$

រឺ $1 = (f^{-1})'(y) \times f'(x)$ (ព្រោះ ដេរីវេ នៃ x ដោយយក x ជាអថេរ គឺស្មើនឹង 1 ហើយ

$$\text{ដោយ (1) } y = f(x) \Rightarrow y'(x) = f'(x))$$

$$\text{រឺ } (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{ដោយ } y = f(x)$$

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{ដោយ } y = f(x)$$

(F-VII-09)

សង្ខេប

នេះជារូបមន្តទូទៅ ។ ដោយអថេរ របស់ f^{-1} គឺ y ដូច្នេះ កាលណាយើង ប្រើរូបមន្តនេះ ចំពោះអនុគមន៍ពិសេសណាមួយ យើងត្រូវ ជំនួស x នៅក្នុង $\frac{1}{f'(x)}$ ដោយ y (ដោយប្រើសម្ព័ន្ធ $y = f(x)$) ។

(R-VII-03)

ឈ- អនុវត្ត រូបមន្តខាងលើ ដើម្បីរក ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $\text{Arcsinus}, \text{Arcosinus}, \text{Arctan}, \text{Arccotan}$

១- ដេរីវេ Arcsinus :

$$y = \text{Arcsin}(x) \Rightarrow x = \sin(y) \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \quad (\text{ដើម្បី អនុគមន៍ } \sin \text{ ប៊ីសេចទីវ})$$

$$y' = \frac{1}{\cos y} \quad (\text{ដោយ (F-VII-09)})$$

ដោយ x ជាអថេរ របស់ y ដូចនេះត្រូវ ជំនួស y ក្នុង $\frac{1}{\cos y}$ ដោយ x

ដោយយើងប្រើ $x = \sin(y)$ ។

$$\text{យើងអាចសរសេរ} \quad \sin^2 y + \cos^2 y = 1$$

$$\text{រឺ} \quad x^2 + \cos^2 y = 1 \Rightarrow \cos^2 y = 1 - x^2$$

យើងដឹងថា ចំពោះ $y = \text{Arcsin}(x)$ y ត្រូវនៅក្នុង ចន្លោះ $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \cos y \geq 0$

$$\text{ដូច្នេះ} \quad \cos^2 y = 1 - x^2 \Rightarrow \cos y = \sqrt{1 - x^2}$$

ដោយសង្ខេប	$y = \text{Arcsin}(x) \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	(F-VII-10)
-----------	--	------------

២- ដេរីវេ Arccosinus :

$$y = \text{Arccos}(x) \Rightarrow x = \cos(y) \quad y \in [0; \pi] \quad (\text{ដើម្បី អនុគមន៍ } \cos \text{ ប៊ីសេចទីវ})$$

$$y' = \frac{1}{-\sin y} \quad (\text{ដោយ (F-VII-09)})$$

ដោយ x ជាអថេរ របស់ y ដូចនេះត្រូវ ជំនួស y ក្នុង $\frac{-1}{\sin y}$ ដោយ x

ដោយយើងប្រើ $x = \cos(y)$ ។

$$\text{យើងអាចសរសេរ} \quad \sin^2 y + \cos^2 y = 1$$

$$\text{រឺ} \quad \sin^2 y + x^2 = 1 \Rightarrow \sin^2 y = 1 - x^2$$

យើងដឹងថា ចំពោះ $y = \arccos(x)$ y ត្រូវនៅក្នុង ចន្លោះ $[0; \pi]$ $\Rightarrow \sin y \geq 0$

$$\text{ដូច្នេះ} \quad \sin^2 y = 1 - x^2 \Rightarrow \sin y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\text{ដោយសង្ខេប} \quad \boxed{y = \arccos(x) \Rightarrow y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}} \quad (\text{F-VII-11})$$

៣- ដេរីវេ $\arctan$:

$$y = \arctan(x) \Rightarrow x = \tan(y) \quad y \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$$

$$y' = \frac{1}{1+\tan^2 y} \quad (\text{ដោយ (F-VII-09)})$$

ដោយ x ជាអថេរ របស់ y ដូចនេះត្រូវ ជំនួស y ក្នុង $\frac{1}{1+\tan^2 y}$ ដោយ x

$$\text{ដោយយើងប្រើ} \quad x = \tan(y) \Rightarrow \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\text{ដោយសង្ខេប} \quad \boxed{y = \arctan(x) \Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}} \quad (\text{F-VII-12})$$

៤- ដេរីវេ $\operatorname{arccotan}$:

$$y = \operatorname{arccotan}(x) \Rightarrow x = \cotan(y) \quad y \in]0; \pi[$$

$$y' = \frac{1}{-(1+\cotan^2 y)} \quad (\text{ដោយ (F-VII-09)})$$

ដោយ x ជាអថេរ របស់ y ដូចនេះត្រូវ ជំនួស y ក្នុង $\frac{-1}{1+\cotan^2 y}$ ដោយ x

ដោយយើងប្រើ $x = \cotan(y) \Rightarrow \frac{1}{1+\cotan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$

ដោយសង្ខេប

$$y = \operatorname{Arccotan}(x) \Rightarrow y' = \frac{-1}{1+x^2}$$

(F-VII-13)

***** ចប់ដេរីវេ *****

មាតិកា..... ទំព័រ

I	បុព្វយោគ.....	1
II	តើដេរីវេជាអ្វី.....	1
III	រូបមន្ត ដេរីវេ.....	1
	-ឧទាហរណ៍ប្រើរូបមន្ត.....	2
	-ក- ដេរីវេអនុគមន៍ ពហុធា.....	2
	-ខ- ដេរីវេអនុគមន៍ គុណ ចែក ($U \times V$ ឬ $\frac{U}{V}$).....	3
	-គ- ដេរីវេ អនុគមន៍ បណ្តាក់.....	4
IV	ការអនុវត្ត.....	6
	-សិក្សាអំពី អថេរភាពនៃអនុគមន៍.....	6
	-ទំនាក់ទំនងរវាង លីមីត និងដេរីវេ- និយមន័យ ដេរីវេត្រង់ x_0 -	
	-បន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង - ឌីផេរ៉ង់ស្យែល $dx - dy$ -.....	7
V	អនុគមន៍ដេរីវេ.....	10
	-និយមន័យ	
	- អនុគមន៍ជាប់ -កំនើន អថេរ Δx -កំនើនអនុគមន៍ Δf រឺ Δy ធៀបនឹង	
	-ឌីផេរ៉ង់ស្យែល dx, df រឺ dy	
VI	បង្ហាញនូវរូបមន្តខ្លះនៃ ដេរីវេ.....	15
	-ដេរីវេនៃអនុគមន៍ : $U + V$	15
	-ដេរីវេនៃអនុគមន៍ : $U \times V$	15
	- ដេរីវេលោការីតមីក :	16
	-ដេរីវេ : $\frac{U}{V}$	16
	-ដេរីវេ : U^m , ដោយ $m \in Q$ (សំនុំចំនួន សនិទាន).....	17

	របៀបបង្ហាញដោយ គេរើង (démonstration par récurrence) -----	18
VII	រូបមន្តដេរីវេ នៃអនុគមន៍ ត្រីកោណមាត្រ-----	22
	-ដេរីវេ: $\sin$ -----	22
	-ដេរីវេ: $\cos$ -----	23
	-ដេរីវេ: $\tan$ -----	23
	-ដេរីវេ: $\cotan$ -----	24
	-សម្ព័ន្ធ រវាងដឺក្រេ និង រ៉ាដ្យង់-----	25
	-អនុគមន៍ អាំងសេចទីវ (injective) -----	26
	-អនុគមន៍ ស្បៀសេចទីវ (surjective) -----	26
	-អនុគមន៍ ប៊ីសេចទីវ (bijective) -----	27
	-អនុគមន៍ ប្រាស -----	30
	-អនុគមន៍ Arcsin -----	31
	-អនុគមន៍ Arccos -----	31
	-អនុគមន៍ Arctan -----	32
	-ដេរីវេអនុគមន៍ប្រាស -----	35
	-ដេរីវេអនុគមន៍: Arcsin -----	36
	-ដេរីវេអនុគមន៍: Arccos -----	36
	-ដេរីវេអនុគមន៍: Arctan -----	37
	-ដេរីវេអនុគមន៍: Arccotan -----	37